arXiv:math/0508584v2 [math.RT] 13 May 2006

Инварианты коприсоединенного представления алгебр Ли размерности $n \leq 8$‡

Рутвиг Кампоамор-Штурсберг§

Аннотация. Мы описываем инварианты корприсоединненого представления для всех вещественных алгебр Ли с нетривиальным разложением Леви до размерности восемь.

УДК: 512.554.1, 539.12.01

---

‡ Работа выполнена при финансовой поддержке UCM по проекту PR1-05/13283.

§ Dpto. Geometría y Topología, Fac. CC. Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid, Plaza de Ciencias 3, E-28040 Мадрид. Эл. почта: rutwig@mat.ucm.es

1. Введение. Постановка задачи

Одной из важных характеристик алгебр Ли являются инвариантные операторы коприсоединенного представления. Алгебраические инварианты (классических) алгебр обычно называют инвариантами или операторами Казимира. Эти инварианты играют важную роль в теории представлений, а также во многих физических приложениях (массовые формулы для мультиплетов, энергетические спектры, квантовые числа и т.д.). Задача отыскания инвариантов Казимира (т.е. полиномиальных инвариантов) для классических алгебр была решена в ряде работ [6, 14, 15, 16]. В частности, число независимых инвариантов простой алгебры Ли равно рангу алгебры [16]. В этом случае, задача сводится к анализу центра универсальной обертивающей алгебры $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$. В случае неполупростых алгебр Ли инварианты коприсоединненого представления могут быть рациональными или иррациональными. Имеются даже алгебры Ли без инвариантов, как например $I\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ или двумерная неабелева алгебра $\mathfrak{r}_2$. Это подразумевает, что альтернативные методы должны быть развиты, чтобы вычуслуть инварианты. Таким образом, вычислиение инвариантов требует разработки иных методов.

В статьях [7, 8] были исследованы инварианты Казимира алгебр Ли неоднородных групп и других алгебр, имеющих важное зчачение в физике. Инварианты трех-, четырех- и пятимерных алгебр были вычислены в [13], а для разрешимых алгебр шестого порядка в [12] и [5]. Другие результаты об инвариантах могут быть найдены в [2, 3, 9].

Как известно, любая произвольная алгебра Ли $\mathfrak{g}$ состоит из двух частей: радикала $\mathfrak{r}$ и факторалгебры $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$. Фундаментальная теорема Леви-Мальцева дает полное описание этого разложения (называемого разложением Леви). А именно, любая алгебра Ли является полупростой суммой $\mathfrak{g} = \mathfrak{s}\overrightarrow{\oplus}_R\mathfrak{r}$ радикала $\mathfrak{r}$ и полупрямой подалгебры $\mathfrak{s}$ (называется фактором Леви), где R –представление алгебры $\mathfrak{s}$ т.ч.

$$R(X) * [Y, Z] = [R(X) * Y, Z] + [Y, R(X) * Z], \forall X \in \mathfrak{s}, \forall Y, Z \in \mathfrak{r}. \quad (1)$$

В частности, для всех $X \in \mathfrak{s}$ оператор R – внешнее дифференцирование алгебры $\mathfrak{r}$.

Это позволяет свести задачу классификации алгебр Ли к следующим случаям:

(i) Классификация всех полупростых алгебр Ли,

(ii) Классификация всех разрешимых алгебр Ли,

(iii) Классификация всех дифференцирований разрешимых алгебр в сооветствии с классификацей простых алгебр Ли.

Задача 1 решена полносью (см. например [10]), но задачи 2 и 3 решены лишь частично (классификация вещественных разрешимых алгебр малых размерностей известна, см. [11, 19].) В работе [21] была дана классификация неразложимых алгебр Ли типа $\mathfrak{g} = \mathfrak{s}\overrightarrow{\oplus}_R\mathfrak{r}$, которых размерности не превышают девяти, а в работе [22] классификаця алгебр Ли 10-го порядка специального вида.

В нашей работе найдены обобщенные инварианты коприсоединенного представления неразложимых алгебр Ли n-го порядка с нетривиальным разложением Леви, где $n \leq 8$.

2. Аналитический метод и некоторые критерии

Мы коротко напоминаем о стандартном методе, чтобы определять инварианты коприсоединенного представления алгебры Ли $\mathfrak{g}$, в частности ее операторы Казимира. Пусть $\left\{C_{ij}^k\right\}$ — структурный тензор алгебры Ли $\mathfrak{g}$ в базисе $\{X_1, .., X_n\}$. Пусть

$$\widehat{X}_i = C_{ij}^k x_k \partial_{x_j} \tag{2}$$

— представление алгебры Ли дифференциальными операторами, где $[X_i, X_j] = C_{ij}^k X_k$ $(1 \leq i < j \leq n,\ 1 \leq k \leq n)$. Аналитическая функция $F\left(x_1, .., x_n\right)$ на $\mathfrak{g}^*$ называется инвариантом (коприсоединненого представления) алгебры $\mathfrak{g}$ если $F(f) = F(ad_g^*(f))$ для любых $f \in \mathfrak{g}$ и $g \in G$, где G — группа Ли, ассоциированная с алгеброй $\mathfrak{g}$.

Предложение 1 *Функция $F(x_1, .., x_n)$ на $\mathfrak{g}^*$ является инвариантом алгебры Ли тогда и только тогда, когда*

$$\widehat{X}_i F(x_1, .., x_n) = C_{ij}^k x_k \frac{\partial}{\partial x_j} F\left(x_1, .., x_n\right) = 0, \quad 1 \leq i \leq n. \tag{3}$$

Система (3) — это система линейных однородных дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка. Для алгебры Ли $\mathfrak{g}$ существует полный набор из $\mathcal{N}(\mathfrak{g})$ инвариантов, где $\mathcal{N}(\mathfrak{g})$ — алгебра Ли определяется формулой

$$\mathcal{N}\left(\mathfrak{g}\right) = \dim \mathfrak{g} - \operatorname{rank}\left(C_{ij}^k x_k\right). \tag{4}$$

Для удобства изложения мы вкратце перечисляем некоторые критерии, используемые при решении задачи интегрирования системы (3) для алгебр Ли, которые мы рассматриваем в настоящей работе.

Критерий 1 *Если $\mathfrak{g}$ изоморфна производной алгебре $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, то алгебра имеет только полиномиальные инварианты.*

Доказательство этой теоремы, как и ряда других, мы здесь не рассматриваем. Его можно найти в [1]. Как можно доказать, если (неполупростая) алгебра $\mathfrak{g}$ удовлетворяет условию $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, то радикал алгебры нильпотентен (см. например [2]). Для полупрямых сумм специального вида имеет место следующая теорема [4]:

Предложение 2 *Пусть $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \overrightarrow{\oplus}_R \mathfrak{h}_m$ $(m \geq 1)$ —алгебра Ли с одномерным центром, где $\mathfrak{s} = \mathfrak{sl}\,(2, \mathbb{R})$ или $\mathfrak{so}\,(3)$ и $\mathfrak{h}_m$ – алгебра Гейзенберга размерности $(2m+1)$. Тогда $\mathcal{N}\,(\mathfrak{g}) = 2$, и нецентральный инвариант C задается формулой*

$$C = \sqrt{\left| \begin{pmatrix} & & & & & & x_1 \\ & & & & & & x_2 \\ & & & & & & x_3 \\ & & & \left(C_{ij}^k x_k\right) & & & \frac{1}{2}x_4 \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & \frac{1}{2}x_{\dim g-1} \\ -x_1 & -x_2 & -x_3 & -\frac{1}{2}x_4 & \ldots & -\frac{1}{2}x_{\dim g-1} & 0 \end{pmatrix} \right|}. \quad (5)$$

Пусть R —представление алгебры Ли $\mathfrak{s}$ и $mult_{D_0}(R)$ – кратность тривиального представления D_0 в R.

Предложение 3 *Пусть $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \overrightarrow{\oplus}_R \mathfrak{r}$. Если $mult_{D_0}(R) = 0$, то радикал нильпотентен. В частности, $\mathcal{N}(\mathfrak{g}) > 0$.*

Доказательство можно найти в [21]. Тогда неразложимые алгебры Ли, которые являются полупрямой суммой полупростой и нильпотентной алгебр Ли удовлетворяют критерию 1 ‖. В [18] следующие результаты были получены, чтобы проанализировать инварианты борелевских подалгебр полупростых алгебр Ли:

Определение 1 *Аналитическая функция $F(x_1, .., x_n)$ на $\mathfrak{g}^*$ называется относительным инвариантом алгебры $\mathfrak{g}$, если*

$$[F, X_i] = \lambda_i X_i, \tag{6}$$

для любых $X_i \in \mathfrak{g}$, где λ_i – числовой множитель.

Лемма 1 *Если F и G относительые инварианты алгебры $\mathfrak{g}$ с числовыми множителями λ_1 (сотв. λ_2), то $F^{\lambda_2} G^{-\lambda_1}$ есть инвариант алгебры.*

Доказательство. Пусть X — элемент алгебры $\mathfrak{g}$.

$$\begin{aligned} \left[X, F^{\lambda_2} G^{-\lambda_1}\right] &= X F^{\lambda_2} G^{-\lambda_1} - F^{\lambda_2} G^{-\lambda_1} X = \left[X, F^{\lambda_2}\right] G^{-\lambda_1} - F^{\lambda_2} G^{\lambda_1} \left[X, G^{\lambda_1}\right] G^{-\lambda_1} \\ &= \lambda_1 \lambda_2 F^{\lambda_2} G^{-\lambda_1} - F^{\lambda_2} G^{-\lambda-1} (\lambda_2 \lambda_1 G^{\lambda_1}) G^{-\lambda_1} = 0. \end{aligned} \tag{7}$$

■

С помощью этой леммы можно изучать инварианты полупрямых сумм $\mathfrak{s} \overrightarrow{\oplus}_R \mathfrak{r}$ полупростых и разрешимых алгебр Ли.

Предложение 4 *Пусть $\widehat{\mathfrak{g}}$ –алгебра Ли и $\mathfrak{g}$ – подалгебра коразмерности 1 такая, что имеет место следующее тождество:*

$$\mathcal{N}(\widehat{\mathfrak{g}}) = \mathcal{N}(\mathfrak{g}) - 1. \tag{8}$$

‖ Нильпотентные алгебры не удовлетворяют этому критерию, но также имеют только инварианты Казимира [10].

Тогда всякий инвариант алгебры $\widehat{\mathfrak{g}}$ является инвариантом также и подалгебры $\mathfrak{g}$. В частности, существует элемент $X \notin \mathfrak{g}$, такой что

$$\frac{\partial C}{\partial x} = 0 \tag{9}$$

для каждого инварианта алгебры $\widehat{\mathfrak{g}}$.

Доказательство. Шарп и др. показали в [17], что число необходимых внутренних разметков индуцированного представления алгебры $\widehat{\mathfrak{g}}$ ассоциированное с редукцией $\mathfrak{g} \hookrightarrow \widehat{\mathfrak{g}}$ равняется

$$n = \frac{1}{2}\left(\dim \widehat{\mathfrak{g}} - \mathcal{N}(\widehat{\mathfrak{g}}) - \dim \mathfrak{g} - \mathcal{N}(\mathfrak{g})\right) + l', \tag{10}$$

где l' – число общих инвариантов, котрие только зависят от генераторов подалгебры $\mathfrak{g}$. В этом случае формула (10) дает:

$$n = \frac{1}{2}\left(-2 \dim \mathcal{N}(\widehat{\mathfrak{g}})\right) + l' \geq 0, \tag{11}$$

тогда $l' = \mathcal{N}(\widehat{\mathfrak{g}})$. Из этого следует, что всякий инвариант F алгебры $\widehat{\mathfrak{g}}$ зависит только от генераторов подалгебры $\mathfrak{g}$. Это подразумевает существование элемента $X \notin \mathfrak{g}$, такой что

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0$$

для каждого инварианта алгебры $\widehat{\mathfrak{g}}$. ■

Следствие 1 *Пусть $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \overrightarrow{\oplus}_R \mathfrak{r}$ с $mult_{D_0}(R) = 1$. Пусть $X \in \mathfrak{r}$ т.ч. $[\mathfrak{s}, X] = 0$. Если $[X, Z(\mathfrak{n})] \neq 0$, где $\mathfrak{n}$ – нильрадикал алгебры $\mathfrak{r}$, тогда*

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \tag{12}$$

для любого инварианта F алгебры $\mathfrak{g}$.

Предложение 5 *Пусть R – неприводимое представление алгебры $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ либо $\mathfrak{so}(3)$. Если $\dim R > 3$, то существует максимальная система F_i инвариантов Казимира полупрямой суммы $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \overrightarrow{\oplus}_R \dim RL_1$, которые не зависят от переменных x_1, x_2, x_3, отвечающих фактору Леви.*

Доказательства этих свойств могут быть найдены в [2, 5].

3. Иллюстративный пример

Опишем, каким образом инварианты приводятся в таблицах 1-4. Оставшиеся случаи исследуются аналогично. Пусть $L^p_{8,1}$ — алгебра Ли, в которой скобка имеет вид:

$$\begin{array}{llll}
[X_1, X_2] = X_3, & [X_1, X_3] = -X_2, & [X_2, X_3] = X_1, & [X_1, X_5] = X_6, \\
[X_1, X_6] = -X_5, & [X_2, X_4] = -X_6, & [X_2, X_6] = X_4, & [X_3, X_4] = X_5, \\
[X_3, X_5] = -X_4, & [X_4, X_8] = X_4, & [X_5, X_8] = X_5, & [X_6, X_8] = X_6, \\
[X_7, X_8] = pX_7, & (p \neq 0)\,. & &
\end{array}$$

в базисе $\{X_1, .., X_8\}$. В этом случае $\mathcal{N}(L_{8,1}) = 2$. Система (3) примет вид системы 8 уравнений, из первых 7 уравнений которой следует, что инварианты не зависят от x_8. Последнее уравнение этой системы имеет вид:

$$\widehat{X}_8 F := x_4 \frac{\partial F}{\partial x_4} + x_5 \frac{\partial F}{\partial x_5} + x_6 \frac{\partial F}{\partial x_6} + p x_7 \frac{\partial F}{\partial x_7} = 0. \qquad (13)$$

Алгебра $L^p_{8,1}$ содержит идеал 7-го порядка, который изоморфен алгебре $L_{6,1} \oplus L_1$ (см. таблица 1). Эта алгебра может иметь только полиномиальные инварианты. Фактически, из разложимости следует, что

$$\mathcal{N}(L_{6,1} \oplus L_1) = \mathcal{N}(L_{6,1}) + \mathcal{N}(L_1). \qquad (14)$$

Алгебра $L_{6,1}$ удовлетворяет критерию 1, следовательно, она имеет только инварианты Казимира. Решая систему (3) подалгебры $L_{6,1}$ получаем инварианты:

$$\begin{aligned} I_1 &= x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 \\ I_2 &= x_1 x_4 + x_2 x_5 + x_3 x_6 \\ I_3 &= x_7. \end{aligned}$$

Из предложения 4 следует, что I_1, I_2, I_3 являются относительными инвариантами уравнения (13). Числовые множители имеют вид

$$\widehat{X}_8\,(I_1) = -2I_1,\ \widehat{X}_8\,(I_2) = -I_2,\ \widehat{X}_8\,(I_3) = -pI_3,$$

Из этого следует, что алгебра $L_{8,1}$ иммет рациональные инварианты, которые согласно леммы 1 записываются в виде:

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{I_1^p}{I_3^2} = \frac{(x_4^2 + x_5^2 + x_6^2)^p}{x_7^2} \\ J_2 &= \frac{I_2^p}{I_3} = \frac{(x_1 x_4 + x_2 x_5 + x_3 x_6)^p}{x_7}. \end{aligned}$$

Таблица 1. Алгебры размерности ≤ 7.

Алгебра	Структурные константы	Инварианты
$L_{5,1}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2,\ C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$ $C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{15}^{5}=-1.$	$I_1=x_3x_4^2-x_1x_4x_5-x_2x_5^2$
$L_{6,1}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1, C_{15}^{6}=1,$ $C_{16}^{5}=-1, C_{24}^{6}=-1, C_{26}^{4}=1, C_{34}^{5}=1,$ $C_{35}^{4}=-1.$	$I_1=x_4^2+x_5^2+x_6^2$ $I_2=x_1x_4+x_2x_5+x_3x_6$
$L_{6,2}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$ $C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{15}^{5}=-1, C_{45}^{6}=1.$	$I_1=2x_2x_3x_6+x_5^2x_2+x_1x_4x_5-x_3x_4^2+\frac{1}{2}x_1^2x_6$ $I_2=x_6$
$L_{6,3}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$ $C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{15}^{5}=-1, C_{j7}^{j}=1.$	— $(j=5,6)$
$L_{6,4}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=2,$ $C_{16}^{6}=-2, C_{25}^{4}=2, C_{26}^{5}=1, C_{34}^{5}=1,$ $C_{35}^{6}=2.$	$I_1=x_5^2-4x_4x_6$ $I_2=x_1x_5+2x_2x_6-2x_3x_4$
$L_{7,1}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1,\ C_{15}^{6}=1,$ $C_{16}^{5}=-1, C_{24}^{6}=-1, C_{26}^{4}=1, C_{34}^{5}=1,$ $C_{35}^{4}=-1, C_{j7}^{j}=1\ \left(4\leq j\leq 6\right).$	$I_1=\left(x_4^2+x_5^2+x_6^2\right)\left(x_1x_4+x_2x_5+x_3x_6\right)^{-2}$
$L_{7,2}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1,\ C_{14}^{7}=\frac{1}{2},$ $C_{15}^{6}=\frac{1}{2}, C_{16}^{5}=-\frac{1}{2}, C_{17}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{24}^{5}=\frac{1}{2},$ $C_{25}^{4}=\frac{1}{2}, C_{26}^{7}=\frac{1}{2}, C_{27}^{6}=-\frac{1}{2}, C_{34}^{6}=\frac{1}{2},$ $C_{35}^{7}=-\frac{1}{2}, C_{36}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{37}^{5}=\frac{1}{2}.$	$I_1=x_4^2+x_5^2+x_6^2+x_7^2$
$L_{7,3}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$ $C_{15}^{5}=-1, C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{47}^{4}=1,$ $C_{57}^{5}=1, C_{67}^{6}=p\ \left(p\neq 0\right).$	$I_1=\left(x_3x_4^2-x_1x_4x_5-x_2x_5^2\right)^{-p}x_6^2$
$L_{7,4}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$ $C_{15}^{5}=-1, C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{45}^{6}=1,$ $C_{47}^{4}=1, C_{57}^{5}=1, C_{67}^{6}=2.$	$I_1=(x_5^2x_2+x_1x_4x_5-x_3x_4^2)x_6^{-1}+2x_2x_3+$ $+\frac{1}{2}x_1^2$
$L_{7,5}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=2,$ $C_{16}^{6}=-2, C_{25}^{4}=2, C_{26}^{5}=1, C_{34}^{4}=1,$ $C_{35}^{5}=2, C_{j7}^{j}=1\ \left(j=,4,5,6\right).$	$I_1=\left(x_1x_5+2x_2x_6-2x_3x_4\right)^2\left(x_5^2-4x_4x_6\right)^{-1}$
$L_{7,6}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1,\ C_{14}^{4}=3,$ $C_{15}^{5}=1, C_{16}^{6}=-1, C_{17}^{7}=-3, C_{25}^{4}=3,$ $C_{26}^{5}=2, C_{27}^{6}=1, C_{34}^{5}=1, C_{35}^{6}=2,$ $C_{36}^{7}=3.$	$I_1=27x_4^2x_7^2-18x_4x_5x_6x_7-x_5^2x_6^2+$ $+4\left(x_6^3x_4+x_7x_5^3\right)$
$L_{7,7}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1,\ C_{14}^{4}=1,$ $C_{15}^{5}=-1,\ C_{25}^{4}=1, C_{27}^{6}=1, C_{34}^{5}=1,$ $C_{16}^{6}=1, C_{17}^{7}=-1, C_{36}^{7}=1.$	$I_1=x_4x_7-x_5x_6$

Таблица 2. Алгебры размерности 8.

Алгебра	Структурные константы	Инварианты
$L_{8,1}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1,\ C_{15}^{6}=1,$	$I_1=\left(x_4^2+x_5^2+x_6^2\right)^p x_7^{-2}$
	$C_{16}^{5}=-1, C_{24}^{6}=-1, C_{26}^{4}=1, C_{34}^{5}=1,$	$I_2=\left(x_1x_4+x_2x_5+x_3x_6\right)^p x_7^{-1}$
	$C_{35}^{4}=-1, C_{j8}^{j}=1\ (4\leq j\leq 7), C_{78}^{7}=p.$	
$L_{8,2}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1,\ C_{14}^{7}=\frac{1}{2},$	$I_1=16(x_4x_5+x_6x_7)+(x_4^2+x_5^2+x_6^2+x_7^2)$
	$C_{15}^{6}=\frac{1}{2}, C_{16}^{5}=-\frac{1}{2}, C_{17}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{24}^{5}=\frac{1}{2},$	$+16(x_1^2+x_2^2+x_3^2)x_8^2+16x_2x_8(x_5x_6-x_4x_7$
	$C_{25}^{4}=\frac{1}{2}, C_{26}^{7}=\frac{1}{2}, C_{27}^{6}=-\frac{1}{2}, C_{34}^{6}=\frac{1}{2},$	$+8x_3x_8(x_4^2-x_5^2+x_6^2-x_7^2)$
	$C_{35}^{7}=-\frac{1}{2}, C_{36}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{37}^{5}=\frac{1}{2}, C_{45}^{8}=1,$	
	$C_{67}^{8}=-1.$	$I_2=x_8$
$L_{8,3}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1,\ C_{14}^{7}=\frac{1}{2},$	
	$C_{15}^{6}=\frac{1}{2}, C_{16}^{5}=-\frac{1}{2}, C_{17}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{24}^{5}=\frac{1}{2},$	
	$C_{25}^{4}=\frac{1}{2}, C_{26}^{7}=\frac{1}{2}, C_{27}^{6}=-\frac{1}{2}, C_{34}^{6}=\frac{1}{2},$	
	$C_{35}^{7}=-\frac{1}{2}, C_{36}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{37}^{5}=\frac{1}{2}, C_{48}^{4}=1,$	
	$C_{58}^{5}=1, C_{68}^{6}=1, C_{78}^{7}=1.$	
$L_{8.4}^{p}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1,\ C_{14}^{7}=\frac{1}{2},$	$I_1=x_4^2+x_5^2+x_6^2+x_7^2$
	$C_{15}^{6}=\frac{1}{2}, C_{16}^{5}=-\frac{1}{2}, C_{17}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{24}^{5}=\frac{1}{2},$	$I_2=\left(x_4^2+x_6^2\right)\left(x_8-2x_3\right)+\left(x_5^2+x_7^2\right)x_8+$
	$C_{25}^{4}=\frac{1}{2}, C_{26}^{7}=\frac{1}{2}, C_{27}^{6}=-\frac{1}{2}, C_{34}^{6}=\frac{1}{2},$	$+4\left(x_2x_4x_7-x_1x_4x_5-x_2x_5x_6-x_1x_6x_7\right)+$
	$C_{35}^{7}=-\frac{1}{2}, C_{36}^{4}=-\frac{1}{2}, C_{37}^{5}=\frac{1}{2}, C_{48}^{48}=p,$	$+2x_3\left(x_5^2+x_7^2\right)$
	$C_{58}^{5}=p, C_{68}^{6}=p, C_{78}^{7}=p, C_{48}^{6}=-1,$	
	$C_{58}^{7}=-1, C_{68}^{4}=1, C_{78}^{5}=1.$	
$L_{8,5}$	$C_{23}^{1}=1, C_{12}^{3}=1, C_{13}^{2}=-1, C_{14}^{7}=\frac{1}{2},$	$I_1=x_8\left(x_7^2+x_6^2-x_6^2-8x_4^2\right)+6\left(x_6^2-x_7^2\right)+$
	$C_{15}^{6}=-\frac{1}{2}, C_{16}^{5}=2, C_{16}^{8}=-1, C_{17}^{4}=-2,$	$+\frac{2}{9}x_8^3-12x_4x_6x_7$
	$C_{18}^{6}=3, C_{24}^{6}=\frac{1}{2}, C_{25}^{7}=\frac{1}{2}, C_{26}^{4}=-2,$	$I_2=12\left(x_4^2+x_5^2\right)+3\left(x_6^2+x_7^2\right)+x_8^2$
	$C_{27}^{5}=-2, C_{27}^{8}=-1, C_{28}^{7}=3, C_{34}^{5}=2,$	
	$C_{35}^{4}=-2, C_{36}^{7}=1, C_{37}^{6}=-1.$	
$L_{8,6}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$	$I_1=x_8$
	$C_{15}^{5}=-1, C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{67}^{8}=1.$	$I_2=2x_1x_4x_5-2x_3x_4^2+2x_2x_5^2+4x_2x_3x_8+$
		$+x_1^2x_8$
$L_{8,7}^{p,q}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$	$I_1=\left(x_3x_4^2-x_1x_4x_5-x_2x_5^2\right)^p x_6^{-2}$
pq$\neq 0$	$C_{15}^{5}=-1, C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{48}^{4}=1,$	$I_2=\left(x_3x_4^2-x_1x_4x_5-x_2x_5^2\right)^q x_7^{-2}$
	$C_{58}^{5}=1, C_{68}^{6}=p, C_{78}^{7}=q.$	
$L_{8,8}^{p}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$	$I_1=\left(x_3x_4^2-x_1x_4x_5-x_2x_5^2\right)^p x_6^{-2}$
p$\neq 0$	$C_{15}^{5}=-1, C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{48}^{4}=1,$	$I_2=\left(p\ln x_7-x_6\ln x_6\right)\left(px_6\right)^{-1}$
	$C_{58}^{5}=1, C_{68}^{6}=p, C_{78}^{6}=1, C_{78}^{7}=p.$	
$L_{8.8}^{0}$	$C_{12}^{2}=2, C_{13}^{3}=-2, C_{23}^{1}=1, C_{14}^{4}=1,$	$I_1=x_6$
	$C_{15}^{5}=-1, C_{25}^{4}=1, C_{34}^{5}=1, C_{48}^{4}=1,$	$I_2=2x_7-x_6\ln\left(x_3x_4^2-x_1x_4x_5-x_2x_5^2\right)$
	$C_{58}^{5}=1, C_{78}^{6}=1.$	

Таблица 3. Алгебры размерности 8. (продолжение)

Алгебра	Структурные константы	Инварианты
$L_{8,9}^{p,q}$ $q \neq 0$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{48}^4 = 1,$ $C_{58}^5 = 1, C_{68}^6 = p, C_{68}^7 = -q, C_{78}^7 = q,$ $C_{78}^7 = p.$	$I_1 = (x_7 - ix_6)^{p-iq} (x_7 + ix_6)^{p+iq}$ $I_2 = (x_3x_4^2 - x_1x_4x_5 - x_5^2x_2)^{p^2+q^2} \times$ $(x_7 - ix_6)^{2(iq-p)}$
$L_{8,10}^p$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{48}^4 = 1,$ $C_{58}^5 = 1, C_{68}^6 = 2, C_{78}^7 = p.$	$I_1 = (2x_2x_3x_6 + x_5^2x_2 + x_1x_4x_5 - x_3x_4^2)\, x_6^{-1}$ $\frac{1}{2}x_1^2$ $I_2 = x_7^2x_6^{-p}$
$L_{8,11}$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{48}^4 = 1,$ $C_{58}^5 = 1, C_{68}^6 = 2, C_{78}^6 = 1, C_{78}^7 = p.$	$I_1 = (2x_2x_3x_6 + x_5^2x_2 + x_1x_4x_5 - x_3x_4^2)\, x_6^{-1}$ $+\frac{1}{2}x_1^2x_6$ $I_2 = (2x_7 - x_6 \ln x_6)\, x_6^{-1}$
$L_{8,12}$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 2,$ $C_{16}^6 = -2, C_{25}^4 = 2, C_{26}^5 = 1, C_{34}^4 = 1,$ $C_{35}^5 = 2, C_{48}^4 = 1, C_{58}^5 = 1, C_{68}^6 = 1,$ $C_{78}^7 = p.$	$I_1 = (x_5^2 - 4x_4x_6)^p\, x_7^{-2}$ $I_2 = (x_1x_5 - 2x_3x_4 + 2x_2x_6)^p\, x_7^{-2}$
$L_{8,13}^{\varepsilon}$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{16}^6 = 1,$ $C_{17}^7 = -1, C_{27}^6 = 1, C_{36}^7 = 1, C_{45}^8 = 1,$ $C_{67}^8 = \varepsilon.$	$I_1 = x_8$ $I_2 = \varepsilon x_8^2\, (4x_2x_3 + x_1^2) + 2x_2x_8\, (x_7^2 + \varepsilon x_5^2)$ $-2x_3x_8\, (\varepsilon x_4^2 + x_6^2) + 2x_6x_7\, (x_1x_8 + x_4x_5)$ $-x_4^2x_7^2$
$L_{8,14}$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{16}^6 = 1,$ $C_{17}^7 = -1, C_{27}^6 = 1, C_{36}^7 = 1, C_{48}^4 = 1,$ $C_{58}^5 = 1.$	$I_1 = x_4x_7 - x_5x_6$ $I_2 = x_1x_4x_5 + x_5x_6x_8 - x_4x_7x_8 + x_2x_5^2$ $-x_3x_4^2$
$L_{8,15}$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{16}^6 = 1,$ $C_{17}^7 = -1, C_{27}^6 = 1, C_{36}^7 = 1, C_{67}^8 = 1,$ $C_{68}^4 = 1, C_{78}^5 = 1.$	$I_1 = x_4x_7 - x_5x_6 - \frac{1}{2}x_8^2$ $I_2 = x_1x_4x_5 + x_5x_6x_8 - x_4x_7x_8 + x_2x_5^2$ $-\frac{1}{3}x_8^3 - x_3x_4^2$
$L_{8,16}$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{16}^6 = 1,$ $C_{17}^7 = -1, C_{27}^6 = 1, C_{36}^7 = 1, C_{48}^4 = 1,$ $C_{58}^5 = 1, C_{68}^4 = 1, C_{68}^6 = 1, C_{78}^5 = 1,$ $C_{78}^7 = 1.$	
$L_{8,17}^p$ $p \neq -1$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{16}^6 = 1,$ $C_{17}^7 = -1, C_{27}^6 = 1, C_{36}^7 = 1, C_{48}^4 = 1,$ $C_{58}^5 = 1, C_{68}^6 = p, C_{78}^7 = p.$	
$L_{8,17}^{-1}$	$C_{12}^2 = 2, C_{13}^3 = -2, C_{23}^1 = 1, C_{14}^4 = 1,$ $C_{15}^5 = -1, C_{25}^4 = 1, C_{34}^5 = 1, C_{16}^6 = 1,$ $C_{17}^7 = -1, C_{27}^6 = 1, C_{36}^7 = 1, C_{48}^4 = 1,$ $C_{58}^5 = 1, C_{68}^6 = -1, C_{78}^7 = -1.$	$I_1 = x_4x_7 - x_5x_6$ $I_2 = x_1\, (x_4x_7 + x_5x_6) + 2x_2x_5x_7 - 2x_3x_4x_6 +$ $x_8\, (x_4x_7 - x_5x_6)$

Таблица 4. Алгебры размерности 8. (продолжение)

Алгебра	Структурные константы	Инварианты
$L^p_{8,18}$ $p \neq 0$	$C^2_{12} = 2, C^3_{13} = -2, C^1_{23} = 1, C^4_{14} = 1,$ $C^5_{15} = -1, C^4_{25} = 1, C^5_{34} = 1, C^6_{16} = 1,$ $C^7_{17} = -1, C^6_{27} = 1, C^7_{36} = 1, C^4_{48} = p,$ $C^6_{48} = -1, C^5_{58} = p, C^7_{58} = -1, C^4_{68} = 1,$ $C^6_{68} = p, C^5_{78} = 1, C^7_{78} = p$	$x_8\left(x_4x_7 - x_5x_6\right)$
$L^0_{8,18}$	$C^2_{12} = 2, C^3_{13} = -2, C^1_{23} = 1, C^4_{14} = 1,$ $C^5_{15} = -1, C^4_{25} = 1, C^5_{34} = 1, C^6_{16} = 1,$ $C^7_{17} = -1, C^6_{27} = 1, C^7_{36} = 1, C^6_{48} = -1,$ $C^7_{58} = -1, C^4_{68} = 1, C^5_{78} = 1.$	$I_1 = x_4x_7 - x_5x_6$ $I_2 = x_1\left(x_4x_7 + x_5x_6\right) + x_2\left(x_5^2 + x_7^2\right) - x_3x_4^2 +$ $+x_8\left(x_5x_6 - x_4x_7\right) - x_3x_6^2$
$L_{8,19}$	$C^2_{12} = 2, C^3_{13} = -2, C^1_{23} = 1, C^4_{14} = 3,$ $C^5_{15} = 1, C^6_{16} = -1, C^7_{17} = -3, C^4_{25} = 3,$ $C^5_{26} = 2, C^6_{27} = 1, C^5_{34} = 1, C^6_{35} = 2,$ $C^7_{36} = 3, C^8_{47} = 1, C^8_{56} = -3.$	$I_1 = x_8$ $I_2 = 12\left(x_2x_3x_8^2 + x_2x_5x_7x_8 - x_3x_4x_6x_8\right) +$ $+4\left(x_4x_6^3 + x_3x_5^2x_8 + x_5^3x_7 - x_2x_6^2x_8\right) +$ $+18\left(x_1x_4x_7x_8 - x_4x_5x_6x_7\right) + 27x_4^2x_7^2 +$ $+3x_1^2x_8^2 - 2x_1x_5x_6x_8 - x_5^2x_6^2$
$L_{8,20}$	$C^2_{12} = 2, C^3_{13} = -2, C^1_{23} = 1, C^4_{14} = 3,$ $C^5_{15} = 1, C^6_{16} = -1, C^7_{17} = -3, C^4_{25} = 3,$ $C^5_{26} = 2, C^6_{27} = 1, C^5_{34} = 1, C^6_{35} = 2,$ $C^7_{36} = 3, C^4_{48} = 1, C^5_{58} = 1, C^6_{68} = 1,$ $C^7_{78} = 1.$	
$L_{8,21}$	$C^2_{12} = 2, C^3_{13} = -2, C^1_{23} = 1, C^4_{14} = 4,$ $C^5_{15} = 2, C^7_{17} = -2, C^8_{18} = -4, C^4_{25} = 4,$ $C^5_{26} = 3, C^6_{27} = 2, C^7_{28} = 1, C^5_{34} = 1,$ $C^6_{35} = 2, C^7_{36} = 3, C^8_{37} = 4.$	$I_1 = 3x_5x_7 - x_6^2 - 12x_4x_8$ $I_2 = -2x_6^3 + 9x_5x_6x_7 + 72x_4x_6x_8 - 27x_4x_7^2$ $-27x_5^2x_8$
$L_{8,22}$	$C^2_{12} = 2, C^3_{13} = -2, C^1_{23} = 1, C^4_{14} = 2,$ $C^6_{16} = -2, C^7_{17} = 1, C^8_{18} = -1, C^4_{25} = 2,$ $C^5_{26} = 1, C^7_{28} = 1, C^5_{34} = 1, C^6_{35} = 2,$ $C^8_{37} = 1.$	$I_1 = x_5^2 - 4x_4x_6$ $I_2 = x_4x_8^2 + x_6x_7^2 - x_5x_7x_8$

Список литературы

[1] L. Abellanas, L. M. Alonso. A general setting for Casimir invariants, J. Math. Phys. **16** (1975), 1580-1584.

[2] R. Campoamor-Stursberg. The structure of the invariants of perfect Lie algebras, J. Phys. A: Math. Gen. **36** (2003), 6709-6723. The structure of the invariants of perfect Lie algebras II, J. Phys. A: Math. Gen. **37** (2004), 3627-3644.

[3] R. Campoamor-Stursberg. An alternative interpretation of the Beltrametti-Blasi formula by means of differential forms, Phys. Lett. A **327** (2004), 138-145.

[4] R. Campoamor-Stursberg. Explizite Formeln für die Casimiroperatoren des semidirekten Produktes einer Heisenberg Lie-Algebra $\mathfrak{h}$ mit der einfachen Lie-Algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, Acta Phys. Polonica B **35** (2004), 2059-2069.

[5] R. Campoamor-Stursberg. Some Remarks Concerning the Invariants of Rank One Solvable Real

Lie Algebras, Alg. Colloq. **12** (2005) 497-518.

[6] И. М. Гельфанд. Центр инфинитезимального группового кольца, Мат. Сб. **26** (1950), 103-112.

[7] А. П. Дёмичев, Н. Ф. Нелипа. Инвариантные операторы неоднородных групп I. Группа $IGL(n,\mathbb{R})$, Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон., **21** є 2 (1980), 3-7. Инвариантные операторы неоднородных групп II. Группа $ISL(n,\mathbb{R})$, Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон., **21** є 2 (1980), 7-10. Инвариантные операторы неоднородных групп III. Группа $ISO(p,q)$, Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон., **21** є 4 (1980), 23-27.

[8] А. П. Дёмичев, Н. Ф. Нелипа, М. Чайчиан. Инвариантные операторы неоднородных групп IV. Унитарные и симплектические группы, Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон., **21** є 4 (1980), 23-27. Инвариантные операторы неоднородных групп V. Группа Вейля, Вестн. Моск. ун-та. Физ., астрон., **21** є 5 (1980), 20-24.

[9] Р. Кампоамор-Штурсберг. Разрешимые алгебры Ли, заданные произведением образующих, и некоторые их приложения, Фунд. Приклад. Мат. **11** (2005), вып. 4, 85-94.

[10] Д. П. Желобенко. компактные группы Ли и их представления, Мир 1978.

[11] Г.М.Мубаракзянов, Классификация разрешимых алгебр Ли шестого порядка с одним ненильпотентным базисным элементом, Известия ВУЗов. Математика. **35** (1963), 104-126.

[12] J. C. Ndogmo. Invariants of solvable Lie algebras of dimension six, J. Phys. A **33** (2000), 2273-2287.

[13] J. Patera, R. T. Sharp, P. Winternitz, H. Zassenhaus. Invariants of low dimensional Lie algebras, J. Math. Phys. **17** (1976), 986-994.

[14] А.Л. Переломов, В. С. Попов. Операторы Казимира для групп $U(n)$ и $SU(n)$, Ядерная физика **3** (1966), 924-931. Операторы Казимира для ортогональной и симплектической групп, Ядерная физика **3** (1966), 1127-1134.

[15] А.Л. Переломов, В. С. Попов. Операторы Казимира для классическых групп, Докл. АН СССР **174** (1967), 287-290.

[16] G. Racah. Sulla caratterizzazione delle rappresentazioni irriducibili dei gruppi semisemplici di Lie, Rend. Lincei **8** (1950) 108-112.

[17] A. Peccia, R. T. Sharp. Number of independent missing label operators, J. Math. Phys. **17**, 1313 (1976).

[18] В. В. Трофимов. Уравнения Эйлера на борелевских подалгебрах полупростых алгебр Ли, Изв. АН СССР, Сер. мат., т.43 (1979), 714-732.

[19] P. Turkowski. Solvable Lie algebras of dimension six. J. Math. Phys. **31** (1990), 1344-1350.

[20] P. Turkowski. Low-dimensional real Lie algebras, J. Math. Phys. **29** (1988), 2139-2144.

[21] P. Turkowski. Structure of real Lie algebras, Linear Alg. Appl. **171** (1992), 197-212.

[22] P. Turkowski. Classification of multidimensional spacetimes, J. Geom. Phys. **4** (1987), 119-132.